Giornate mediche Di Santa Maria Nuova
Il paziente "Fragile"

Opzioni gestionali nello scompenso cardiaco

Dr.ssa Lavinia Goedecke

U.O. Cardiologia

Heart failure hospitalization incidence according to year and age group

**Ricoveri per Scompenso Cardiaco
negli Ospedali Italiani 1999-2008**

Il rischio di mortalità aumenta ad ogni ospedalizzazione

Hospitalization for HF: why so important ?

Setoguchi S. et al. *Am Heart J* 2007.

Solomon et al. *Circulation* 2007.

Risk of death increases substantially with each subsequent HF hospitalization

**59% degli uomini e 45% delle donne > 65 aa
sono morti a 5 anni**

The proportion of survivals for frail (solid rectangles) and fit individuals (total rectangles) decreases with the chronological age.

However, frail individuals show lower survival at all age groups than do fit individuals

“Fragilità”

**progressivo declino della riserva fisiologica,
con inadeguata resistenza agli stress,
legata all'invecchiamento e spesso,
ma non obbligatoriamente,
associata ad una patologia cronica,
predisponente alla vulnerabilità e ad out-comes avversi**

Si parla di Fragilità se almeno tre delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- Perdita di peso involontaria (> 5% negli ultimi 12 mesi)**
- Facile affaticabilità nelle attività quotidiane**
- Riduzione della attività fisica**
- Riduzione della velocità del cammino**
- Riduzione della forza muscolare**

**Progressione
CHF**

Alto rischio!!

COMORBILITA'

FRAGILITA'

ETA'

Prevalenza Fragilità:

3.2% tra 65-70 aa
23.1% > 90 aa

**Nuova variabile
indipendente di
mortalità?**

Con l'età cresce:

- Incidenza CHF e rischio morte
- Incidenza fragilità e rischio morte

Prevalenza CHF nel paziente non fragile 1.8%

Prevalenza CHF nel paziente fragile 14%

Con età, comorbilità e fragilità aumenta rischio mortalità

In tempi di spending review tutti in tp intensiva?

TI solo per alto rischio

2%

Età come unico fattore di rischio:
bassi tassi di mortalità (CH elettiva)

Tassi mortalità aumentano nei ricoveri per cause mediche

Le comorbilità fattori di rischio

- Overall; N = 124,885
- Elective/Scheduled Surgical ("Zero Factor") with No Other Risk Factors; N = 17,488
- Elective/Scheduled Surgery with 1 or more Risk Factors; N = 11,834
- △ Emergency Surgery with No Other Risk Factors; N = 4,651
- ▲ Emergency Surgery with 1 or More Additional Risk Factors; N = 9,319
- Medical with No Other Risk Factors; N = 31,486
- Medical with 1 or More Additional Risk Factors; N = 50,147

Età fattore di rischio indipendente?
No, perché?

-EF conservata
-meno patologia ischemica e fattori di rischio
MA
-maggiori comorbidità non CV
(IR, anemia, pregresso etp)

Minor supporto respiratorio e circolatorio e renale

MODO DI MORTE

HFREF - EF < 45%
HFPEF - EF > 45%

**EF CONSERVATA
 MORTE NON CV
 (INSUFF. CARDIACA)**

CAUSA DI MORTE

HFREF - EF < 45%
HFPEF - EF > 45%

**EF CONSERVATA
 CAUSA MORTE NON CV
 33% vs 16%**

Overall survival and freedom from arrhythmic death in patients under 75 years of age (A, C), and 75 years or older (B, D)

Morte improvvisa:

0.51 < 50 aa

0.26 > 80 aa

Ad 1 anno
Morte 20% pz
anziani

3/4 per morte NON
aritmica

Analisi rischi- benefici
Aspettativa - qualità di vita

Amiodarone vs ICD?

**Nel 2006
su 8.900 trials randomizzati: il 3.5% di anziani
su 706 metanalisi: l' 1.2%**

O è giusto il contrario?

E' giusto "adattare" questo paziente ai trials?

Heart failure medications in Euro Heart Failure Survey II at discharge by age group

➤ 80 aa

- Arrivano meno al Dipartimento Cardiologico
- Meno studiati
- Meno trattati

Heart failure prescription rates over time in the octogenarian group

**Sempre più anziani in TI
ma sottotrattati e
“MAL-trattati”!**

PRESCRIZIONE INAPPROPRIATA

Media Europea 19.1 % (2.9 - 38.5%) – **Rapporto 1:5**

- Sottoprescrizione
- Sovraprescrizione
- Prescrizione scorretta

POLITERAPIA (> 4 FARMACI): nel 20-50% dei pazienti anziani

1. Rischio di interazioni:

Tra farmaco e farmaco, farmaco e patologia, farmaco e cibo, farmaco ed alcool e farmaco e prodotti erboristici.

La probabilità di una interazione tra farmaci passa dal 7.9% nei pz giovani al 18.4% nei pz anziani.

2. Compliance e prescrizione inappropriata:

Circa il 20% dei pz risulta non compliant (intenzionale o non intenzionale se legato a barriere socio-culturali o fisiche).

Prescrizione inappropriata (studio Sirente, inappropriato uso di farmaci nel 26% dei pz anziani).

3. Variazioni farmacodinamica e farmacocinetica:

Incrementano il rischio di reazioni avverse.

4. Efficacia e sicurezza:

Circa il 5-10% delle ammissioni ospedaliere è dovuto ad una reazione avversa a farmaci.

Tra i farmaci maggiormente imputati vi sono i FANS, gli anticoagulanti, i calcio antagonisti, i diuretici, la digitale, gli immunosoppressori.

**Troppo o poco trattati?
Problema qualitativo...**

CONCLUDENDO...

- Con l'età aumenta incidenza CHF e rischio morte
- Con l'età aumenta incidenza fragilità e rischio morte
- Con l'età aumentano comorbidità
- Con l'età aumenta incidenza e rischio politerapie
- L'anziano è vulnerabile

MA

l'anziano sano è diverso dall'anziano fragile

CONCLUSIONI

1. **Stratificazione prognostica**
2. **Approccio multidisciplinare e multiparametrico con pianificazione di un programma assistenziale “personalizzato” sulle caratteristiche cliniche, sociali e cognitive del paziente**
3. **Gestione delle comorbidità e degli eventi “stressanti”**
4. **Gestione terapia**

1. STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA

**Distinguere tra anziano ed anziano fragile
per decidere come e quanto trattare**

- **Stratificazione prognostica precoce al DEA per identificare il corretto livello di tutoraggio del paziente (chi in TI...)**
- **Gestione della fase acuta di malattia e messa in atto di tutte le strategie terapeutiche necessarie alla migliore stabilizzazione del paziente (chi IOT, PTCA, CVVH...)**
- **Stratificazione prognostica intraospedaliera e predimissione (chi ICD...)**
- **Pianificazione di un programma assistenziale “personalizzato” sulle caratteristiche cliniche, sociali e cognitive del paziente (domicilio, riabilitazione, RSA...)**

SISTEMA "PERSONA"
Pz al centro del percorso

MEDICINA 4 P:
Predizione
Prevenzione
Personalizzazione
Partecipazione

**Preferenze
individuali**

**Stato cognitivo
Stato sociale
Rete familiare
Fragilità
Clinica
Biologia**

2. APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E MULTIPARAMETRICO

- **Setting differenti (dall'ingresso in ospedale alla dimissione)**
- **Medicina narrativa**
- **Approccio integrato con altre discipline**
- **Valutazione del grado di fragilità**
- **Programmi di self-management**
- **Follow-up infermieristico**
- **Programmi di assistenza domiciliare**

Necessità assistenziali pz con scompenso

- **Prevenzione delle instabilizzazioni**
- **Controlli clinici periodici**
- **Valutazione e cura delle comorbidità**
- **Educazione sanitaria**
- **Educazione alla autogestione**
- **Sostegno psicologico**
- **Sostegno sociale**

Approfondimento diagnostico

- **Monitoraggio esami ematici (BNP)**
- **Ecocardiogramma**
- **Test di capacità funzionale**
(6 MWT – Test cardiopolmonare)
- **Polisonnografia**
- **Bioimpedenzometria (BIVA)**

AMBULATORIO SCOMPENSO CARDIACO

“Centro Servizi” di coordinamento

- **Emodinamista - Elettrofisiologo**
- **Internista**
- **Diabetologo**
- **Nefrologo**
- **Dietista**
- **Cardiochirurgo**

Collegamento con il territorio

- **MMG**
- **Assistente Sociale**
- **Follow-up telefonico**
- **Monitoraggio infermieristico domiciliare**
- **Monitoraggio di parametri in Telemedicina**

3. GESTIONE COMORBILITA' E STRESS

- Rapida diagnosi e correzione eventi acuti
- Considerazione stato psico-emotivo
- Considerazioni variabili sociali
- Considerazione vulnerabilità implicita

4. TERAPIA

1. “Start slow - go slow”:

- sapere quando essere “aggressivi”
- meno farmaci, ma tp di qualità

2. Schemi terapeutici

- monosomministrazioni
- utilizzare i nomi dei farmaci generici
- reminder e schemi...

3. Cercare e risolvere le ragioni della scarsa aderenza

4. Allertare in modo semplice, sui farmaci pericolosi (FANS)

Grazie per l'attenzione