Stato confusionale acuto (Delirium)

Sandro Domenichetti, Psichiatra ASL
Firenze

"Vi giuro, signori, che aver coscienza di troppe cose è una malattia, una vera e propria malattia." F. Dostojevskij

STATI ALTERATI DI COSCIENZA

- Stato confusionale
- Torpore
- Stupor
- Coma
- Mutismo acinetico (Coma vigile)
- Stato apallico
- Stato vegetativo persistente
- Sindrome locked-in
- Ipersonnia

FISIOPATOLOGIA DEL DELIRIUM

- Non del tutto chiarita
- Lesioni funzionali piuttosto che strutturali
- Caratteristici riscontri all'EEG (rallentamento generalizzato)
- Via finale comune di molteplici meccanismi patogenetici (alterazione delle vie colinergiche)

Sostanza Reticolare Attivante

E' un'area cerebrale responsabile della regolazione del risveglio e del passaggio sonno-veglia.

Moruzzi, Magoun(1949):

Ipotesi di un generatore centrale in continua attività tranne che nel sonno e nelle lesioni della formazione reticolare a livello della parte alta del tronco-encefalo. È una entità più fisiologica che anatomica, includendo strutture del tronco encefalico e del diencefalo.

IL DELIRIUM

- DISTURBO NEUROCOMPORTAMENTALE CARATTERIZZATO DA:
 - CAMBIAMENTO ACUTO DEL COMPORTAMENTO
 - DECORSO FLUTTUANTE
 - COMPROMISSIONE DELL'ATTENZIONE

Caratteristiche cliniche del delirium (DSM 5)

1. Esordio acuto e Decorso fluttuante
2. Deficit attentivo
3. Disorganizzazione del pensiero
4. Alterazione del livello di coscienza
5. Compromissione delle capacità cognitive
6. Disturbi della percezione (allucinazioni) e deliri (persecutori, falsi riconoscimenti)
7. Disturbi psicomotori (irrequietezza, rallentamento)
8. Alterazioni del ritmo sonno-veglia
9. Disturbi dell'emotività (ansia, depressione, irritabilità, apatia, euforia)

ESORDIO ACUTO CON DECORSO FLUTTUANTE

- SI SVILUPPA RAPIDAMENTE NEL GIRO DI ORE O GIORNI
- LE FLUTTUAZIONI SONO CIRCADIANE , CON INTERVALLI DI "LUCIDITA'"
- GROSSOLANE VARIAZIONI DELL'ATTENZIONE, SI VERIFICANO IN MODO IMPREVEDIBILE ED IRREGOLARE CON ACCENTUAZIONE NOTTURNA

DEFICIT DI ATTENZIONE

E' IL SINTOMO CARDINALE

- DISTRAIBILITA'
- VARIABILITA' ATTENTIVA CON
COMPORTAMENTO NON PREVEDIBILE
- ATTENZIONE ATTIRATA VERSO STIMOLI
APPARENTEMENTE INSIGNIFICANTI

PENSIERO DISORGANIZZATO

- INTRUSIONI DI PENSIERI E SENSAZIONI CONTRASTANTI
- INCAPACITA' DI SIMBOLIZZARE E DI FINALIZZARE
- CONFUSIONE (incapacità di mantenere il flusso di pensiero con l'abituale chiarezza, coerenza e velocità)
- DELIRI

IL LINGUAGGIO

- RIFLETTE IL MODO CONFUSO DI PENSARE
 - CONTENUTO
 - INCOERENTE
 - DIGRESSIVO
 - CIRCONLOCUTORIO
 - RICCO DI ESITAZIONI, RIPETIZIONI, PERSEVERAZIONI
 - ESTREMAMENTE RIDOTTA LA CAPACITA' INFORMATIVA (afasia, disartria, errori semantici e sintattici)

LIVELLO DI VIGILANZA

- RIDOTTO CON POSSIBILE LETARGIA
- IPERVIGILANZA CON LABILITA' E DISTRAIBILITA'
- POSSIBILE ALTERNANZA DELLE DUE CONDIZIONI
- ALTERAZIONI DEL RITMO SONNO-VEGLIA
- CONDIZIONA IL COMPORTAMENTO MOTORIO
 - RALLENTAMENTO vs IPERATTIVITA' CON DISPERCEZIONI

DISTURBI DELLA PERCEZIONE

- SONO SECONDARI ALLA PERDITA DEI RIFERIMENTI SPAZIO TEMPORALI
 - CONFABULAZIONI
 - ALLUCINAZIONI
 - VISIVE
 - A CONTENUTO SGRADIVOLE
 - MANIFESTAZIONI "ONIROIDI"

PROFILO COGNITIVO

- DISORIENTAMENTO S-T
- DEFICIT DELLA MEMORIA
RIDOTTA INTEGRAZIONE TRA PRESENTE E PASSATO,
CONFABULAZIONE. SINDROME DI CAPGRAS: FAMILIARI NON
RICONOSCIUTI COME TALI ("IMPOSTORI")
- ALTERAZIONE DELLE CAPACITA' VISUO-
PERCETTIVE
 - FALSO RICONOSCIMENTO OGGETTI
 - ELABORAZIONE DATI SPAZIALI
 - ORGANIZZAZIONE GRAFICA
- DISTURBO DELLA SCRITTURA

DISTURBI DELL'IDEAZIONE E DELLA SFERA EMOTIVA

- IDEE PERSECUTORIE, DELIRI PARANOIDEI
- FALSI CONVINCIMENTI
- DISFORIA CON INCAPACITA' AL CONTROLLO DELLE EMOZIONI
- DEPRESSIONE, CON INERZIA PSICOMOTORIA, ANEDONIA, ALTERAZIONE DELL'APPETITO
- SITUAZIONI ESTREME DI INIBIZIONE PSICOMOTORIA, INCONTINENZA URINARIA, CADUTE A TERRA

Sottotipi clinici

- "Iperattivo": stato di coscienza "ipervigile", agitazione psicomotoria, disturbo delirante;
- "Ipoattivo": sopore, apatia, iporeattività agli stimoli fino al coma, rischio decubito, degenza più lunga;
- "Misto".

Epidemiologia e prognosi

Epidemiologia

Soggetti ospedalizzati >65enni:

- ✓ al momento del ricovero in DEA, prevalenza del 10-25%
- ✓ un ulteriore 10-20% sviluppa delirium nel corso del ricovero in ospedale : Reparti medici 10-48%; Reparti chirurgici 7-52 %; **Frattura del femore 30 %** ; Stroke 13-50 %; Chirurgia coronarica 23-34 %; **Pazienti in Intensiva (tutte le età) 40 %**, Geriatria 70% ; Subintensiva 30%

Soggetti residenti in comunità: prevalenza 1-2%, (14% > 85 anni)

Prognosi

Il verificarsi di uno stato confusionale nell'anziano è associato a:

- maggior durata e costi dell'ospedalizzazione
- maggior rischio di riospedalizzazione
(*George et al., Age Ageing, 1997*)
- maggior declino funzionale
- maggior rischio di istituzionalizzazione
- maggior mortalità a 1 e 12 mesi (La mortalità durante il ricovero è compresa tra il 22 e il 76% , le percentuali più elevate riguardano i soggetti con sepsi e infarto miocardico, mentre la mortalità ad un anno di distanza varia tra il 35 e il 40%).

Diagnosi: Confusion Assessment Method (CAM)

Il 70% dei casi di delirium non viene riconosciuto all'ingresso in Ospedale (soprattutto forme ipocinetiche)
Han et al., Acad Emerg Med. 2009

A seguito di un intervento di formazione sul personale, triplicano i casi di delirium riconosciuti
Rockwood et al., J Am Geriatr Soc, 1994

Il riconoscimento del delirium è facilitato dall'utilizzo di strumenti di screening, validati per l'uso da parte del personale sanitario (medici, infermieri)

Confusion Assessment Method (CAM)

Inouye SK, vanDyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegel AP, Horwitz RI.

Clarifying confusion: The Confusion Assessment Method. A new method for detection of delirium. Ann Intern Med. 1990; 113: 941-948.

Diagnosi eziologica: primo livello (medico e infermiere)

- Anamnesi
 - ✓ farmacologica (farmaci prescritti e farmaci realmente assunti, compresi i farmaci da banco e le assunzioni occasionali!)
 - ✓ tossicologica
- Parametri vitali
- Esame obiettivo generale e neurologico
- sO₂ e stick glicemico
- Esami di laboratorio di routine
- Ricerca di siti di infezione occulta (esame urine, RX torace)
- ECG

*modificato da Inouye SK, N Engl J Med, 2006
Nassisi D et al., Mt Sinai J Med, 2006*

Diagnosi eziologica: secondo livello

- Esami ematochimici selezionati

ormoni tiroidei, dosaggio di farmaci, screening tossicologico, ammoniemia, cortisolemia, vitamina B12

- Emogasanalisi

- Neuroimaging

primo livello se non è possibile raccogliere l'anamnesi o effettuare l'esame obiettivo (pz. agitato)

- Puntura lombare

- EEG

*modificato da Inouye SK, N Engl J Med, 2006
Nassisi D et al., Mt Sinai J Med, 2006*

Diagnosi differenziale del Delirium

	Delirium	Demenza	Bouffé delirante
esordio	acuto	insidioso	acuto
decorso	fluttuante	progressivo	fluttuante
stato di coscienza e orientamento	confuso disorientato	mantenuti fino agli ultimi stadi	stato oniroide orientato
attenzione e memoria	memoria a breve termine compromessa, disturbo della attenzione	memoria a breve termine compromessa, disturbo della attenzione	memoria non compromessa, attenzione diminuita
sintomi psicotici	frequenti	meno frequenti	frequenti

Fattori di rischio

Cause principali

- ✓ **Alterazioni idro-elettrolitiche**
 - disidratazione (diarrea, vomito, diuretici, scompenso diabetico,...);
 - Iposodiemia, ipo- e ipercalcemia (colpo di calore)
- ✓ **Infezioni:** broncopolmonite, infezione urinaria, sepsi.
- ✓ **Disturbi endocrino-metabolici**
 - insufficienza renale ed epatica;
 - ipoglicemia, ipertiroidismo, iposurrenalismo
- ✓ **Insufficienza cardiaca o respiratoria, ipossia**
(compreso infarto miocardico acuto)
- ✓ **Ritenzione urinaria, fecaloma**
- ✓ **Patologie del Sistema Nervoso Centrale** (in particolare ictus)
- ✓ **Farmaci** (soprattutto nuove assunzioni) o **sostanze tossiche**

Delirium da farmaci

Antipsicotici triciclici (fenotiazine), Antidepressivi triciclici (Nortriptilina), Trazodone, Benzodiazepine, Litio

Barbiturici

Antistaminici

Antiparkinsoniani (L-dopa, bromocriptina(parlodel) ,orfenedrina (disipal), pergolide(nopar)

Antidiarroici (difenossilato)

Miorilassanti, spasmolitici

Prodotti da banco per il trattamento sintomatico della tosse (Codeina)

Antiaritmici (digitale, alfa e beta bloccanti, ace inibitori, calcioantagonisti, diuretici)

Analgesici (oppiacei, aspirina, FANS)

Steroidi (prednisolone)

Antibiotici (Cefalosporine, Chinolonici)

Principali fattori di rischio

A parità di "causa" potenziale, quali pazienti sono a maggior rischio di sviluppare delirium?

- Età superiore ai 65 anni
- Storia di deterioramento cognitivo o Demenza
- Frattura di femore
- Patologia acuta grave (in peggioramento o a rischio di aggravamento)

Fattori di rischio: predisponenti

[precedono l'episodio acuto, generalmente non modificabili]

- ✓ Età avanzata
- ✓ Decadimento cognitivo preesistente, demenza
- ✓ Precedente storia di delirium
- ✓ Disabilità
- ✓ Deficit sensoriali (vista, udito)
- ✓ Storia di abuso alcolico
- ✓ Polipatologia e polifarmacoterapia
- ✓ Malnutrizione

Fattori di rischio: precipitanti

*si manifestano durante l'episodio acuto, sono **modificabili***

- ✓ **Patologie mediche intercorrenti:** infezioni, disidratazione, malnutrizione, ritenzione urinaria acuta, fecaloma
- ✓ **Farmaci**
- ✓ **Immobilizzazione**
- ✓ **Intervento chirurgico** (chirurgia ortopedica, cardiocirurgia)
- ✓ **Ambiente del ricovero:**
 - **Terapia Intensiva**
 - **Manovre invasive** (compreso il catetere vescicale)
 - **Uso di mezzi di contenzione**
 - **Isolamento sociale**
 - **Assenza di luce naturale**
 - **Ripetuti cambi di stanza**
- **Interruzione del sonno, stress emotivo**
- **Dolore**

Trattamento

- A. Terapia eziologica
(50% cause multiple)
- B. Terapia di supporto e prevenzione
delle complicanze
- C. Terapia non farmacologica
- D. Terapia farmacologica sintomatica
dell'agitazione

Terapia farmacologica

1. **Aloperidolo**: farmaco di prima scelta, efficace

- dosaggio iniziale: 0,5-1 mg da ripetere al bisogno dopo 30 minuti

- mantenimento: 0,5-1 mg 1-3 volte al dì

- ✓ Elevato rischio di parkinsonismo (dipendente da dose, particolarmente se durata della terapia > 7 giorni)
- ✓ Rara ma grave sindrome maligna da neurolettici
- ✓ Controindicato nel cardiopatico instabile, no somministrazione e.v. per maggior rischio di tossicità cardiaca (allungamento del tratto QTc → lieve ma significativo aumento del rischio di torsioni di punta ed arresto cardiaco)

2. Antipsicotici atipici - efficacia paragonabile ad aloperidolo con < effetti collaterali extrapiramidali; sindrome metabolica

Olanzapina: 2.5-10 mg die (anche i.m.)

Risperidone: 0.5-1 mg due volte al dì

Quetiapina: 12,5-100 mg due volte al dì

3. Trazodone

Minor rischio di parkinsonismo degli antipsicotici, minor rischio di effetto paradosso delle benzodiazepine. Possibile effetto ipotensivo. No studi nel delirium, molto usato nei disturbi del comportamento nella demenza.

Dose: 25-150 mg die

Disponibile anche formulazione per uso parenterale

La prevenzione è possibile? Evidenze scientifiche
Studio controllato su 852 > 70 anni, senza delirium al
momento del ricovero. **Il trattamento non
farmacologico di**

- deficit cognitivo
- deprivazione del sonno
- immobilità
- deficit visivo
- deficit uditivo
- disidratazione

ha ridotto di un terzo l'incidenza di nuovi casi di delirium
nell'arco del ricovero, rispetto alle usuali cure ospedaliere.

(Inouye et al., N Engl J Med, 1999)

Trattamento non farmacologico

- Aiutare l'orientamento con grandi orologi
- Assicurare una buona veduta dalla finestra
- Ripetere regolarmente le informazioni
- Massimizzare l'acuità visiva: occhiali, luce
- Massimizzare l'acuità uditiva: assicurarsi l'uso e la funzione di protesi, ridurre i rumori competitivi
- Usare oggetti familiari al paziente (foto)
- Assicurare oggetti di riconoscimento adeguati

Tende, non
muri, che
separano gli
ambienti

Triage e
diagnosi rapide
vs comorbidità
e politerapia

RUMORE

Ambienti senza
finestre, luce
artificiale

DEA

Barelle, non
letti, dove i
pazienti
attendono
esami e/o il
posto letto

Pavimenti
sdrucchiolevoli

Pazienti soli

L'ambiente

**Practice Guideline for the Treatment
of Patients With Delirium**
American Psychiatric Association
Am J Psychiatry, 1999

- **Trattamento delle patologie di base ed attenzione rivolta alla stabilizzazione dei parametri vitali**
- **Rimozione dei fattori contribuenti**
- **Evitare il più possibile la contenzione e la somministrazione di farmaci psicoattivi**
- **Prevenzione delle complicanze**
- **Adeguate assistenza (incoraggiare la presenza dei familiari)**
- **Posizionare il paziente in un ambiente tranquillo; rinforzare l'orientamento spazio-temporale**